

## RÉVISIONS

Dans cette feuille, on appelle « équivalent simple de  $f$  en  $a$  » un équivalent de la forme  $C(x-a)^\alpha(\ln(x-a))^\beta$  avec  $C, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . On appelle « équivalent simple de  $f$  en  $+\infty$  » un équivalent de la forme  $Cx^\alpha(\ln x)^\beta e^{\gamma x}$ . Attention, certaines fonctions n'admettent pas d'équivalent simple !

### Exercice 1.

a. Donner des équivalents simples en 0 des fonctions suivantes :

- $f : x \mapsto \frac{(\sin x)^2}{3x^2}$ ,
- $g : x \mapsto \tan(x) \ln(1+x)$ ,
- $h : x \mapsto \frac{x^4 - 2x^2}{2x^6 + x^3}$ .

b. Donner un équivalent simple en 0 des fonctions suivantes :

- $i : x \mapsto \sin(x) + x^3$ ,
- $j : x \mapsto \sin(x) - x$ .

**Exercice 2.** Donner des équivalents simples des fonctions suivantes, en 0 et en  $+\infty$  :

- $f : x \mapsto x^2 + x$ ,
- $g : x \mapsto x + \sqrt{x}$ ,
- $h : x \mapsto x + 1 + \ln(x)$ ,
- $i : x \mapsto \ln(x) + (\ln(x))^2$ ,
- $j : x \mapsto e^x + \sin(x)$ ,
- $k : x \mapsto \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ .

Lesquelles de ces fonctions sont des des  $o(x)$  en 0 ? et en  $+\infty$  ?

### Exercice 3.

En calculant des DL, donner des équivalents simples des fonctions suivantes aux points demandés :

- $f : x \mapsto 2e^x - \sqrt{1+4x} - \sqrt{1+6x^2}$  en 0,
- $g : x \mapsto \ln(1+x) + \ln(1-x)$  en 0,
- $h : x \mapsto \ln(x)$  en 0, 1, 2,  $+\infty$ ,
- $i : x \mapsto \sqrt{2+x} - \frac{x}{4} - \frac{3}{2}$  en 2,
- $j : x \mapsto \cos(x) - \sin(x)$  en  $\frac{\pi}{4}$ ,
- $k : x \mapsto e^x - e^{2-x}$  en 1,
- $l : x \mapsto \sqrt{x^2+1}$  en  $+\infty$ ,
- $m : x \mapsto \sqrt{x^2+1} - 2\sqrt[3]{x^3+x} + \sqrt[4]{x^4+x^2}$  en  $+\infty$ ,
- $n : x \mapsto \ln(x+1) - \ln(x)$  en  $+\infty$ .

### Exercice 4.

a. Montrer que si  $f \sim_b g$  et  $\lim_a u = b$ , alors  $f \circ u \sim_a g \circ u$  (avec  $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ ).

b. Donner des équivalents simples des fonctions suivantes en 0 :

- $f : x \mapsto \sin((x-1)^2)$  en 1,
- $g : x \mapsto \tan(2\sqrt{x})$  en 0,
- $h : x \mapsto x^2 \sin(\frac{1}{x})$  en  $+\infty$ .

**Exercice 5.**

- a. (i) Les fonctions  $x \mapsto 2x$ ,  $x \mapsto 2x + 1$  sont-elles équivalentes en  $+\infty$  ?  
 Les fonctions  $x \mapsto e^{2x}$ ,  $x \mapsto e^{2x+1}$  sont-elles équivalentes en  $+\infty$  ?  
 Les fonctions  $x \mapsto 1 + x$ ,  $x \mapsto 1 + x^2$  sont-elles équivalentes en  $0$  ?  
 Les fonctions  $x \mapsto \ln(1 + x)$ ,  $x \mapsto \ln(1 + x^2)$  sont-elles équivalentes en  $0$  ?
- (ii) Soit  $u, v$  deux fonctions telles que  $u \sim_a v$ . A-t-on  $f \circ u \sim_a f \circ v$  pour toute fonction  $f$  ?
- b. (i) On suppose que  $u \sim_a v$ . Montrer que  $u^\alpha \sim_a v^\alpha$  pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ .
- (ii) On suppose que  $u \sim_a v$  et  $\lim_a u = \lim_a v = 0$  ou  $+\infty$ . Montrer que  $\ln \circ u \sim_a \ln \circ v$ .
- (iii) Donner des équivalents simples des fonctions suivantes aux points demandés :  
 —  $f : x \mapsto \ln(x^2 + 1)$  en  $+\infty$ ,  
 —  $g : x \mapsto \sqrt{2x^3 + x^2}$  en  $0$ ,  
 —  $h : x \mapsto \ln(\sin(x))$  en  $0$ .
- (iv) Montrer que  $\ln \circ u \sim_a u - 1$  si  $\lim_a u = 1$ .  
 En déduire un équivalent simple de  $\ln(\cos x)$  en  $0$ .

**Exercice 6.** Calculer les intégrales suivantes :

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_1^2 \frac{dx}{x(1 + \ln x)}, & I_2 &= \int_0^1 \frac{dx}{\operatorname{ch} x}, & I_3 &= \int_0^1 \sqrt{1 - t^2} dt, \\
 I_4 &= \int_0^1 x^2 e^x dx, & I_5 &= \int_1^2 (\ln x)^2 dx, & I_6 &= \int_1^e x(\ln x)^2 dx, \\
 I_7 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(2x) dx, & I_8 &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{(\sin x)^2} dx, & I_9 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\cos x)^3 (\sin x)^3}{1 + (\sin x)^2} dx, \\
 I_{10} &= \int_0^1 \frac{e^x dx}{10 - 3e^x}, & I_{11} &= \int_0^1 \frac{dx}{4x^2 + 9}.
 \end{aligned}$$

**Exercice 7.** Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

$$\begin{aligned}
 f_1(x) &= \frac{1}{1 + \sqrt{x}}, & f_2(x) &= x^2 \sqrt{1 + x^3}, & f_3(x) &= \frac{1 + \ln x}{x \ln x}, & f_4(x) &= \frac{x^2}{2 + x^3}, \\
 f_5(x) &= (x + 1)e^x, & f_6(x) &= e^x \sin x, & f_7(x) &= \arctan x, & f_8(x) &= x \cos 2x, \\
 f_9(x) &= \frac{x^2}{(x^2 + 1)^2}, & f_{10}(x) &= \frac{x}{x^3 - 3x + 2}, & f_{11}(x) &= \frac{x\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}, \\
 f_{12}(x) &= (x^2 - x + 3) \sin x, & f_{13}(x) &= \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}, & f_{14}(x) &= \frac{\sin 3x}{\sqrt{\cos x}}.
 \end{aligned}$$