

SÉRIES ENTIÈRES

Exercice 1. Considérons la série de fonctions de terme général $u_n : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)z^{2n+1}$.

- Écrire cette série de fonctions sous la forme d'une série entière $(\sum a_n x^n)$ en précisant la valeur des coefficients a_n .
- La suite $(a_n)_n$ est bornée. Que peut-on en déduire pour le rayon de convergence ?
- Dire pourquoi la série $(\sum_n a_n)$ diverge. Que peut-on en déduire pour le rayon de convergence ?
- Quel est le domaine de définition de la série de fonctions $(\sum_n u_n)$?

Exercice 2. Calculer le rayon de convergence des séries entières dont les termes généraux sont donnés ci-dessous :

$$a_n = \frac{z^n}{n\pi^n}, \quad b_n = \ln(n)z^{2n}, \quad c_n = \frac{(n+1)^4}{n!}z^n, \quad d_n = \frac{z^n}{2^{3n-2}}, \quad e_n = (1+i)^{2n}z^{3n}.$$

Exercice 3. On pose $a_n = \int_0^1 (1+t^2)^n dt$. Déterminer le rayon de convergence de $(\sum a_n x^n)$. On pourra justifier puis utiliser l'encadrement $2t \leq 1+t^2 \leq 2$ sur $[0, 1]$.

Exercice 4. Calculer $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{ina}}{n!}$ puis $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(na)}{n!}$, pour $a \in \mathbb{R}$ fixé.

Exercice 5.

- Déterminer le rayon de convergence R de la série entière $(\sum_n \frac{x^n}{n^2})$. Étudier la convergence en R et $-R$. On note f la somme de cette série entière.
- Montrer que f est de classe C^1 sur $] -1, 1[$. Dériver f et donner une expression de f' sans le symbole somme.
- Calculer la dérivée de la fonction g définie par $g(x) = f(x) + f(1-x) + (\log x) \log(1-x)$.
- Montrer que f est continue en $x = 1$.
- Démontrer la formule $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = (\log 2)^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^{n-1}n^2}$.

Exercice 6. Calculer $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ à l'aide d'une série entière.

Exercice 7. Donner le rayon de convergence R des séries entières suivantes et calculer leur somme sur le disque ouvert de convergence.

$$\left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n+1}{n!} z^n \right), \quad \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} (-1)^{n+1} n(n+2) z^{n+1} \right), \quad \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{z^n}{(2n)!} \right), \quad \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^3 z^n}{n!} \right).$$

Exercice 8. On fixe $|a| < 1$ et on pose $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \sin(a^n x)$.

- Montrer que $f(x)$ est bien définie sur \mathbb{R} .
- Montrer que f est de classe C^1 , puis C^∞ sur \mathbb{R} .
- Exprimer $f^{(k)}(x)$ comme somme d'une série.
 En déduire que $|f^{(k)}(x)| \leq 1/(1-|a|)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $k \in \mathbb{N}^*$.
- Montrer que f est développable en série entière en 0 et déterminer son DSE en 0.

Exercice 9. Développer en série entière au point 0 les fonctions suivantes et préciser le rayon de convergence de la série entière obtenue :

$$f_1(x) = \log\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right), \quad f_2(x) = \frac{4}{x^2 - 2x + 2}, \quad f_3(x) = e^x \cos x,$$

$$f_4(x) = (\cos x)^3, \quad f_5(x) = \int_0^x \frac{1}{t} \arctan(t^2) dt.$$

En déduire la valeur de $f_4^{(k)}(0)$ pour tout k .

Exercice 9.

- Déterminer le DSE de $f : x \mapsto \ln(x)$ en $x_0 = 2$.
- Déterminer le DSE en $x_0 = 1$ de la fonction f_2 de l'exercice 9.

Exercice 10. On note c_n les coefficients du DSE en 0 de $f : x \mapsto (\ln(1-x))^2$.

- (i) Rappeler le DSE en 0 de $\ln(1-x)$.
- (ii) Donner une expression de c_n sous forme d'une somme.
- (iii) Exprimer c_n en fonction des sommes harmoniques $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.
- (i) Vérifier l'expression $-2\ln(1-x) = (1-x)f'(x)$, pour tout $x \in]-1, 1[$.
- (ii) En déduire une relation de récurrence pour la suite $(d_n)_n = (nc_n)_n$.
- (iii) Retrouver le résultat de la question a.

Exercice 11.

- Montrer qu'il existe une fonction f continue sur \mathbb{R} telle que $f(x) = \frac{\sqrt{1+2x^2}-1}{x^2}$ pour tout $x \neq 0$.
- Montrer que f admet un développement en série entière au voisinage de 0, et déterminer le rayon de convergence de la série entière ainsi obtenue.
- Calculer les trois premiers termes du DSE.

Exercice 12. Pour quelles valeurs de $a \in \mathbb{R}$ existe-t-il une fonction f non nulle développable en série entière au point 0, telle que $f'(x) = f(ax)$? Préciser le rayon de convergence de la série entière obtenue.

Exercice 13. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.

- Montrer que f est développable en série entière au point 0 et que le rayon de convergence de la série entière ainsi obtenue est infini.
- Montrer que f est solution de l'équation différentielle $y' - xy = 1$.
- En déduire le développement en série entière au point 0 de f .
- Démontrer l'égalité :
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1 \times 3 \times \dots \times (2n+1)} = \sqrt{e} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2 \times 4 \times \dots \times 2n \times (2n+1)}.$$

Exercice 14. Résoudre l'équation différentielle $(1+x^2)y'' + xy' - 4y = 0$ sur \mathbb{R} , en recherchant des solutions développables en série entière en 0.

Exercice 15. On considère la fonction $f : x \mapsto x/(e^x - 1), 0 \mapsto 1$ définie sur \mathbb{R} entier. On définit les *nombre de Bernoulli* B_k en posant $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} B_k x^k / k!$.

- Montrer que la fonction est développable en série entière en 0. *Cela justifie la définition précédente.*
- Calculer B_0, B_1, B_2, B_3 en effectuant un DL en 0. *On pourra utiliser un DL₄ de exp.*
- On a $(e^x - 1)f(x) = x$. En effectuant un produit de Cauchy, démontrer la relation de récurrence suivante :

$$\forall n \geq 2 \quad \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} B_k = 0. \quad (1)$$

En déduire la valeur de B_4 .

- Vérifier que $f(x) + x = f(-x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. En déduire que $B_{2k+1} = 0$ pour $k \geq 1$.
- On rappelle que $\tanh(z) = (e^{2z} - 1)/(e^{2z} + 1)$ pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus (\mathbb{Z} + \frac{1}{2})i\pi$, et que $\tan(x) = -i \tanh(ix)$. Vérifier que $f(4z) - f(2z) = z \tanh(z) - z$ pour z proche de 0. En déduire les coefficients des DSE en 0 de \tanh et \tan en fonction des nombres de Bernoulli.