

INTÉGRALES GÉNÉRALISÉES

Exercice 1. Étudier l'intégrabilité des fonctions suivantes sur les intervalles précisés ci-dessous : $h(x) \leq -C \ln x$ CV ;

$m(x) \leq C e^{-cx}$ CV ; $n(x) \geq 1/x$ DV ; $o(x)$ chVar CV ; $p(x) \leq e^{-cx}$ CV ; $q(x) \leq e^{-cx}$ CV

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - $a : x \mapsto \frac{\sqrt{x}^2}{x}$ sur $[1, +\infty[$, - $c : x \mapsto \frac{1}{x \ln x}$ sur $[2, +\infty[$, - $e : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x}$ sur $]0, 1]$, - $g : x \mapsto \ln(2x)$ sur $]0, 1]$, - $i : x \mapsto \frac{1}{(x-1)\sqrt{x-1}}$ sur $]1, 2]$, - $k : x \mapsto x^2 \exp(-x)$ sur $[0, +\infty[$, - $m : x \mapsto x(\sin x)e^{-x}$ sur $[0, +\infty[$, - $o : x \mapsto x \exp(-\sqrt{x})$ sur $[0, +\infty[$, - $q : x \mapsto \frac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x}$ sur $[2, +\infty[$. | <ul style="list-style-type: none"> - $b : x \mapsto \frac{(\ln x)^2}{\sqrt{x}}$ sur $[1, +\infty[$, - $d : x \mapsto \sqrt{x} \ln(x)$ sur $]0, 1]$, - $f : x \mapsto \frac{1}{x^2 \ln x}$ sur $]0, \frac{1}{2}]$, - $h : x \mapsto \sqrt{-\ln x}$ sur $]0, 1]$, - $j : x \mapsto \exp(-3x)$ sur $[0, +\infty[$, - $l : x \mapsto \exp(-2 \ln x)$ sur $[1, +\infty[$, - $n : x \mapsto \exp(-\sqrt{\ln x})$ sur $[1, +\infty[$, - $p : x \mapsto \exp(-x \arctan x)$ sur $[0, +\infty[$, |
|--|---|

Exercice 2. Étudier l'intégrabilité des fonctions suivantes sur les intervalles précisés ci-dessous : $a(x) \sim b(x) \sim \ln(x)/x^{3/2}$

CV ; $c(x) \sim e^{-x}$ CV ; $d(x) \sim \pi/4x \ln(x)$ DV ; $\frac{1}{x} = O(e(x))$ DV ; $f(x) \sim 1/2x\sqrt{\ln x}$ DV ; $g(x) \sim \sqrt{2/x}$ CV ; $h(x) \sim 1/2x$ DV ; $i(x) \sim 1/\sqrt{x}$ CV ; $j(x) \sim 1/x$ DV ; $k(x) \sim 1/\sqrt{x}$ CV ; $l(x) \sim 2/(1-x)$ DV ; $m(x) \sim 1/2x$ DV.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - $a : x \mapsto \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x^3-1}}$ sur $[1, +\infty[$, - $c : x \mapsto \arctan e^{-x}$ sur $[0, +\infty[$, - $e : x \mapsto (\operatorname{ch} \sqrt{\ln x})^{-2}$ sur $[2, +\infty[$, - $g : x \mapsto \arccos(\frac{x-1}{x})$ sur $[1, +\infty[$, - $i : x \mapsto \frac{\cos x}{\sqrt{x+x^2}}$ sur $]0, 1]$, - $k : x \mapsto \frac{\operatorname{ch} x - \cos x}{x^{5/2}}$ sur $]0, 1]$, - $m : x \mapsto 1 + x \ln(\frac{x}{x+1})$ sur $]0, +\infty[$. | <ul style="list-style-type: none"> - $b : x \mapsto \frac{\ln x}{\sqrt{x^3+x^2+1}}$ sur $[1, +\infty[$, - $d : x \mapsto \frac{\arctan x}{x \ln(1+x^2)}$ sur $[1, +\infty[$, - $f : x \mapsto \sqrt{\ln(x+1)} - \sqrt{\ln x}$ sur $[1, +\infty[$, - $h : x \mapsto x + 1 - \sqrt{x^2 + 2x}$ sur $[1, +\infty[$, - $j : x \mapsto \frac{1}{e^x - \cos x}$ sur $]0, 1]$, - $l : x \mapsto \frac{1}{1-\sqrt{x}}$ sur $[0, 1[$, |
|---|---|

Exercice 3. Discuter, suivant la valeur du paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$, la convergence des intégrales suivantes :

- $I = \int_0^{+\infty} x^\alpha \arctan(x) dx$, CV : $] -2, -1[$
- $J = \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^\alpha} dx$, CV : $]1, +\infty[$
- $K = \int_0^{+\infty} x^\alpha \ln(x + e^{\alpha x}) dx$. CV : $] -2, -1[$

Exercice 4. Calculer les intégrales suivantes, après avoir justifié leur convergence :

- $I = \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x}} dx$. $y = \sqrt{1-x}$, $I = 4(\ln 2 - 1)$
- $J = \int_0^{+\infty} x e^{-\sqrt{x}} dx$. $x = y^2$ puis IPP, $J = 12$
- $K = \int_0^1 \frac{x \ln x}{(x^2+1)^2} dx$. IPP avec $a \rightarrow 0$, $K = -\ln(2)/4$

Exercice 5. On pose $I_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- a. Justifier l'existence de I_n pour tout n .
- b. Déterminer une relation de récurrence entre les intégrales I_n .
- c. Calculer I_n pour tout n .

$(-1)^n n!$

Exercice 6. Pour tout $a > 0$ on pose $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2+x^2}$.

- Justifier l'existence de $I(a)$ pour tout $a > 0$.
- En effectuant le changement de variable $x = 1/y$, montrer que $I(1) = 0$.
- En effectuant le changement de variable $x = ay$, déterminer la valeur de $I(a)$ pour tout $a > 0$.

$\pi \ln(a)/2a$

Exercice 7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on considère les intégrales

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^n)} \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^{+\infty} \frac{x^n dx}{(1+x^2)(1+x^n)}.$$

- Justifier l'existence de I_n et J_n pour tout n .
- Montrer que $I_n + J_n = \frac{\pi}{2}$ pour tout n .
- À l'aide du changement de variable $x = 1/y$, déterminer les valeurs de I_n et J_n pour tout n .

$I_n = J_n$

Exercice 8. On cherche à calculer l'intégrale de Gauss $G = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

- On rappelle qu'on a $e^t \geq 1+t$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a

$$\forall u \in [0, n] \quad \left(1 - \frac{u}{n}\right)^n \leq e^{-u} \quad \text{et} \quad \forall u \geq 0 \quad e^{-u} \leq \left(1 + \frac{u}{n}\right)^{-n}.$$

- Démontrer qu'on a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx \leq G \leq \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx.$$

On appelle I_n, J_n les intégrales aux membres de gauche et de droite.

- Grâce à des changements de variables appropriés, relier I_n et J_n aux intégrales de Wallis $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^n dx$.

$$x = \sqrt{n} \sin t, \quad x = \sqrt{n} \tan t$$

- On rappelle que $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$. Montrer que $G = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Exercice 9.

- Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx$ converge.
- Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ converge. Indication : utiliser une intégration par parties.
- Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{(\sin x)^2}{x} dx$ diverge. Indication : linéariser $(\sin x)^2$.
- Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ n'est pas absolument convergente. Indication : utiliser la question précédente.

Exercice 10. On pose $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ et $g(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x+\sin x}}$.

- Étudier la convergence de l'intégrale $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ et sa convergence absolue. On pourra s'inspirer de l'exercice 9.
- Montrer que $f \sim_{+\infty} g$. Plus précisément, montrer qu'il existe une fonction $h(x) = O(x^{-3/2})$ telle que

$$g(x) = f(x) - \frac{(\sin x)^2}{x} + h(x).$$

- Étudier la convergence de l'intégrale $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ et sa convergence absolue.

Exercice 11.

- Pour quelles valeurs de $\alpha > 0$ l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha}$ est-elle convergente ? absolument convergente ? $\alpha > 0, \alpha > 1$
- Pour quelles valeurs de $\alpha > 0$ l'intégrale $\int_1^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{\sin x}{x^\alpha}\right)$ est-elle convergente ? absolument convergente ? $\alpha > 1, \alpha > 1$