

FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES ET TOPOLOGIE DE \mathbb{R}^n

Exercice 1. Déterminer et représenter graphiquement les ensembles de définition des fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \frac{1}{x^2 + y^2}; & g(x, y) &= \frac{1}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}; & h(x, y) &= \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}\sqrt{1 - y^2}}; \\ i(x, y) &= \frac{1}{\sqrt{(1 - x^2)(1 - y^2)}}; & j(x, y) &= 2 + \sqrt{-(x - y)^2}; & k(x, y) &= \ln(x^2 - y). \end{aligned}$$

Exercice 2. On rappelle qu'une fonction polynomiale $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, et que la composée, la somme et le produit de deux fonctions continues sont continus. Montrer que les fonctions suivantes sont continues sur \mathbb{R}^2 :

- | | |
|---|--|
| a. $f(x, y) = xy + 2x^2y^2 - y^3$ | b. $f(x, y) = \sin(x) + x^2$ |
| c. $f(x, y) = \cos(xy^2) + \exp(2xy^2)$ | d. $f(x, y) = \ln(2 + x^2 + y^2) + \exp(xy)$ |
| e. $f(x, y) = \cos(x) \sin(y^2)$ | |

Exercice 3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} (1 + x^2 + y^2) \frac{\sin y}{y} & \text{si } y \neq 0 \\ 1 + x^2 & \text{si } y = 0. \end{cases}$$

Montrer que f est continue sur \mathbb{R}^2 .

On introduira la fonction « $\frac{\sin t}{t}$ » de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .

Exercice 4. On considère les fonctions $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définies par $f(0, 0) = g(0, 0) = 0$ et les formules suivantes, pour $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$f(x, y) = \frac{2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad g(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}.$$

Montrer que f et g sont continues sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, puis en $(0, 0)$.

On pourra démontrer et utiliser l'inégalité $2xy \leq x^2 + y^2$.

Exercice 5. On définit une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en posant

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\ln(1 + x^2 + y^2)} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Soit α un paramètre réel fixé et \mathcal{D}_α la droite d'équation $y = \alpha x$ dans \mathbb{R}^2 .

Soit γ_α un paramétrage continu de \mathcal{D}_α tel que $\gamma_\alpha(0) = (0, 0)$.

- b. Déterminer $\lim_{t \rightarrow 0} f(\gamma_\alpha(t))$.
- c. La fonction f est-elle continue en $(0, 0)$? Peut-on modifier sa valeur en $(0, 0)$ pour la rendre continue?

Exercice 6. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, puis sur toute droite passant par $(0, 0)$.

L'application f est-elle continue en $(0, 0)$? On pourra utiliser un paramétrage de la parabole d'équation $y = x^2$.

Exercice 7. Les sous-ensembles de \mathbb{R} suivants sont-ils ouverts, fermés ou ni l'un ni l'autre ? On pourra notamment les exprimer comme intervalles ou réunions d'intervalles.

$$\begin{aligned} A &=]-2, \pi] \cup [3, 5[& B &= \text{ }^c(\{0\} \cup [4, 5]) \\ C &= \{x \in \mathbb{R} \mid |x-1| < 2 \text{ ou } x > 3\} & D &= \{x \in \mathbb{R} \mid |2x-4| \geq 6\} \cap \mathbb{R}_- \\ E &= \{n^{-1} \mid n \in \mathbb{N}^*\} & F &= \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \\ G &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left[e^{-n}, \frac{2n}{n+1} \right] & H &= \bigcap_{n \geq 2} \left[3 - \frac{2}{n^2}, 3 + \frac{2n}{n-1} \right] \end{aligned}$$

Exercice 8. On considère les sous-ensembles suivants de \mathbb{R}^2 :

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0 \text{ et } y > 0\}, \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}.$$

- Soit $P_0 = (x_0, y_0) \in A$.
Trouver un réel $r > 0$ tel que la boule ouverte de centre P_0 et rayon r soit incluse dans A .
- Soit $P_n = (x_n, y_n)$ une suite de points de B qui convergent vers un point $P = (x, y)$ de \mathbb{R}^2 .
Montrer que P appartient à B .
- A et B sont-ils ouverts, fermés, ou ni l'un ni l'autre ?
Le redémontrer à l'aide d'images réciproques.

Exercice 9. Dire si les sous-ensembles suivants de \mathbb{R}^2 sont ouverts, fermés, ou ni l'un ni l'autre, en justifiant :

- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1\}$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - x^2 \leq 1 \text{ et } x^2 + y^2 < 2\}$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0 \text{ et } y = \frac{1}{x^2}\}$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sin(x^2 + y^2) \geq 0\}$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 1, y \leq 2 \text{ et } x - y \geq 0\}$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\} \cup \{(1, 0)\}$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 - x^2 = 1\}$
- $([2, 3] \cup \{0\}) \times [-1, 1]$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 - xy > 0\}$
- $\mathbb{Z} \times (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z})$
- $\{(\cos t, \sin t) \mid t \in \mathbb{R}\}$
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 - (x^2 + y^2) = 0\}$

Montrer que le dernier ensemble est encore fermé lorsqu'on lui enlève le point $(0, 0)$.

Exercice 10. Les sous-ensembles suivants de \mathbb{R}^3 sont-ils ouverts, fermés, ou ni l'un ni l'autre ?

- $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y^2 + z^3 > 1\}$
- $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \sin(xyz) \in]0, \frac{1}{2}]\}$
- $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid e^{x+y+z} \in \mathbb{Z} < 2\}$
- $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \sin(x) + \cos(yz) < 0\}$
- $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^3 > y^2 \text{ et } z \geq 0\}$

Exercice 11. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on considère le sous-ensemble $H_n \subset \mathbb{R}^2$ défini comme suit :

$$H_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > nx\}.$$

- On fixe n . Montrer que H_n est ouvert.
- On considère $Q = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} H_n$.
(i) Montrer que $Q = \mathbb{R}_- \times \mathbb{R}_+^*$.
(ii) Montrer que Q n'est ni ouvert ni fermé.

Exercice 12. Si A, B sont deux parties de \mathbb{R}^n , on note $A + B = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$.

- Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$ on a $\{x\} + B(y, r) = B(x + y, r)$.
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ et tout ouvert $O \subset \mathbb{R}^n$, $\{x\} + O$ est encore un ouvert de \mathbb{R}^n .
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ et tout ouvert $F \subset \mathbb{R}^n$, $\{x\} + F$ est encore un fermé de \mathbb{R}^n .
- Montrer que pour toute partie $A \subset \mathbb{R}^n$ et tout ouvert $O \subset \mathbb{R}^n$, $A + O$ est encore un ouvert de \mathbb{R}^n .
- Montrer que pour toute partie finie $A \subset \mathbb{R}^n$ et tout fermé $F \subset \mathbb{R}^n$, $A + F$ est encore un fermé de \mathbb{R}^n .
- Trouver deux fermés $A, B \subset \mathbb{R}$ tels que $A + B$ n'est pas fermé.

Exercice 13. Soit F un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^n .

- Montrer que si F est ouvert, alors $F = \mathbb{R}^n$.
- Montrer que F est fermé.