Université de Caen
UFR de Sciences
L2 MASS

2e semestre 2006-2007
Mathématiques
Algèbre

Feuille n° 6

Exercice 1. On munit $\mathbb{R}^3$ du produit scalaire usuel. Soit D la droite de $\mathbb{R}^3$ engendrée par le vecteur $v = (3, 1, 2)$.

a. Trouver une équation puis une base orthonormale de $D^\perp$.

b. Calculer les projetés orthogonaux de $e_1 = (1, 0, 0)$ sur D et sur $D^\perp$.

c. Écrire la matrice dans la base canonique des projections orthogonales p_D, $p_{D^\perp}$ sur D et $D^\perp$.

d. Vérifier que $p_D + p_{D^\perp} = \mathrm{Id}$.

Exercice 2. Soit P le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ d'équations

$$\begin{cases} x + 2y - t = 0 \\ x - 3y + z + t = 0. \end{cases}$$

On munit $\mathbb{R}^4$ du produit scalaire usuel. Quelle est la matrice dans la base canonique de la symétrie orthogonale de $\mathbb{R}^4$ par rapport à P ?

Exercice 3. On considère l'espace euclidien orienté usuel $\mathbb{R}^3$. Soit D la droite de $\mathbb{R}^3$ engendrée (et orientée) par le vecteur $v = (1, -2, 2)$.

a. Trouver une base orthonormée directe de $\mathbb{R}^3$ dont le premier vecteur appartient à D.

b. Quelles sont les matrices dans la base canonique de

(i) la symétrie orthogonale par rapport à D ?

(ii) la rotation d'axe D et d'angle $\pi/2$?

(iii) la rotation d'axe D et d'angle $2\pi/3$?

Exercice 4. Soit a un paramètre réel et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$M = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} a-1 & -a-2 & a-1 \\ -a-2 & a-1 & 1-a \\ a-1 & 1-a & a+2 \end{pmatrix}.$$

a. Montrer que f est diagonalisable.

b. Calculer et factoriser le polynôme caractéristique de f.
On fera apparaître deux 0 *sur la 2e ligne en opérant sur les lignes et les colonnes.*

c. Pour quelles valeurs de a l'endomorphisme f est-il une symétrie ?

d. Trouver une base de vecteurs propres pour f lorsque $a = 0$.

Exercice 5. Compléter la matrice suivante en une matrice de rotation

$$A = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 6 & 3 & \cdot \\ -2 & 6 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}.$$

Y a-t-il plusieurs solutions ? Déterminer l'axe et le cosinus de l'angle des rotations obtenues.

Exercice 6. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a. On munit $\mathbb{R}^3$ du produit scalaire usuel. Montrer que f est une isométrie.

b. Montrer que f a une unique valeur propre que l'on déterminera.

c. Trouver une base orthonormée (u_1, u_2, u_3) de $\mathbb{R}^3$ telle que u_1 est vecteur propre de f.

d. Quelle est la matrice de f dans la base (u_1, u_2, u_3) ?

e. Montrer qu'il existe une unique rotation r et une unique symétrie orthogonale s par rapport à un plan telles que $f = r \circ s = s \circ r$. Préciser l'axe et l'angle de r.

Exercice 7. On munit $\mathbb{R}^2$ du produit scalaire usuel. Soit D la droite de $\mathbb{R}^2$ d'équation $x + 2y = 0$. Soient p la projection orthogonale de $\mathbb{R}^2$ sur D, et s la symétrie orthogonale de $\mathbb{R}^2$ par rapport à D.

a. Ecrire les matrices de p et de s dans la base canonique.

b. Trouver toutes les droites Δ de $\mathbb{R}^2$ telles que les droites Δ et $s(\Delta)$ sont orthogonales.

Exercice 8. On munit $\mathbb{R}^3$ du produit scalaire usuel. Soient a, b, c, d des nombres réels et soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} b & a & a \\ a & c & a \\ a & a & d \end{pmatrix}.$$

a. Pour quelles valeurs de a, b, c, d la matrice A est-elle orthogonale ?

b. Pour quelles valeurs de a, b, c, d l'endomorphisme f est-il une symétrie orthogonale par rapport à un plan ? Dans ce cas, préciser par rapport à quel plan.

c. Pour quelles valeurs de a, b, c, d l'endomorphisme f est-il une rotation ? Dans ce cas, préciser l'axe et l'angle de f.

Exercice 9. On munit $\mathbb{R}^3$ du produit scalaire usuel.
On considère la droite D engendrée par le vecteur $u_1 = \frac{1}{5}(3, 0, -4)$.

a. Trouver une base orthonormée (u_1, u_2, u_3) de $\mathbb{R}^3$, avec $u_2 = (0, 1, 0)$.

b. Donner les matrices dans la base (u_1, u_2, u_3) de

(i) p, la projection orthogonale sur $D^\perp$;

(ii) s, la symétrie orthogonale par rapport à $D^\perp$;

(iii) r, une rotation d'axe D et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

c. Donner les matrices de p, s et r dans la base canonique.

Exercice 10. On munit $\mathbb{R}^3$ du produit scalaire usuel. On considère f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est donnée par

$$M = \begin{pmatrix} 2a & b & -a \\ -a & a & c \\ b & 2a & a \end{pmatrix}.$$

a. Pour quelles valeurs de a, b et c l'application f est-elle une isométrie ?

b. On se place dans le cas où $a = \frac{4}{9}$, $b = \frac{1}{9}$ et $c = -\frac{7}{9}$.

(i) Montrer que f est une rotation.

(ii) Déterminer son axe et le cosinus de son angle.