

FEUILLE N^O 2

Exercice 1. Écrire les parties suivantes de \mathbb{R} et leurs complémentaires comme réunions d'intervalles :

- | | |
|---|--|
| a. $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$ | b. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 \leq 2\}$ |
| c. $[2, 3[\cup \{0\}$ | d. $] -3, 4[\cup [2, 5[$ |
| e. $\mathbb{Z} \cup \mathbb{R}_-$ | f. $\mathbb{R}_+^* \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x - 3 > 1\}$ |

En déduire si ces sous-ensembles sont fermés, ouverts, ou si on ne peut pas conclure par cette méthode.

Exercice 2. Lorsque c'est possible sans calcul, dire si les sous-ensembles suivants de \mathbb{R} sont ouverts, fermés ou ni l'un ni l'autre.

$$\begin{aligned} A_1 &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left[1 + \frac{2}{n^2}, 3 - \frac{1}{2n} \right] & A_2 &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left[\sin\left(\frac{n}{n^2 + 1}\right), 4 \right] \\ A_3 &= \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left[3 - \frac{2}{n^2}, 3 + \frac{2n}{n-1} \right] & A_4 &= \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left[-\frac{2}{n}, 2 + \frac{n}{n+1} \right] \end{aligned}$$

Exprimer A_1 , A_3 et A_4 comme intervalles et conclure.

Exercice 3. Exprimer comme intervalles les sous-ensembles A_1 , A_2 , A_3 , $B \subset \mathbb{R}$ définis par :

$$A_k = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \geq \sin\left(\frac{n\pi}{k}\right) \right\} \quad B = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left[\cos\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}, \cos\frac{1}{n} + \sin\frac{1}{n} \right].$$

Exercice 4. Exprimer les parties suivantes de \mathbb{R} à partir d'images réciproques de sous-ensembles plus simples :

- | | |
|---|--|
| a. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 1 \leq 2\}$ | b. $\{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \geq \frac{1}{3}\}$ |
| c. $\{x \in \mathbb{R} \mid \operatorname{ch}(x) > 3 \text{ ou } \operatorname{ch}(x) < -2\}$ | d. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^3 + 3x - 1 < \cos(3x)\}$ |
| e. $\{x \in \mathbb{R} \mid \exp(x) \in [1, 2] \text{ ou } \ln(x) \in [1, 2]\}$ | f. $\{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) > \frac{1}{3} \text{ et } \cos(x) > \frac{1}{3}\}$ |
| g. $\{x \in \mathbb{R} \mid \cos(x) \neq \exp(-x)\}$ | h. \mathbb{Z} |

En déduire si ces sous-ensembles sont fermés, ouverts, ou si on ne peut pas conclure par cette méthode.

Exercice 5. Soit $E : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction partie entière, et considérons

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x - E(x).$$

- a. Tracer le graphe de f sur $[-3, 3]$.
- b. Écrire $I = f^{-1}([0, \frac{1}{2}])$ et $J = f^{-1}([\frac{1}{2}, 1])$ comme réunions infinies d'intervalles.
- c. I et J sont-ils ouverts, fermés, ou ni l'un ni l'autre ? Commenter.

Exercice 6. Soit f et g deux applications continues de \mathbb{R} dans \mathbb{R} . Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on pose

$$\varphi(x) = \max(f(x), g(x)).$$

- a. Montrer que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ on a $\max(a, b) = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$.
- b. Montrer que la fonction φ est continue.
- c. En déduire que le sous-ensemble de \mathbb{R} suivant est fermé :

$$A = \{x \geq 0 \mid \max(2 \sin x, \exp(\cos x)) \in \mathbb{N}\}.$$

Exercice 7. On considère les sous-ensembles suivants de \mathbb{R} :

$$A = \mathbb{R}^*, \quad B = [e, \pi[, \quad C = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

- a. Montrer qu'ils ne sont pas fermés, en utilisant des suites.
- b. Donner une méthode plus rapide pour montrer que A n'est pas fermé.
- c. Montrer que B n'est ni ouvert ni fermé, à l'aide de suites.
- d. Montrer que $C \cup \{0\}$ est fermé.

On pourra écrire le complémentaire de $C \cup \{0\}$ comme réunion d'un nombre infini d'intervalles.

Exercice 8. Soit f une application de \mathbb{R} dans \mathbb{R} telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et soit $A = \{f(n) \mid n \in \mathbb{N}\}$. On note $B(x, r) =]x - r, x + r[$ la boule ouverte de centre x et rayon r dans \mathbb{R} .

- a. Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{R}$ l'intersection $A \cap B(x, r)$ ne contient qu'un nombre fini de points.
- b. En utilisant la question précédente, montrer que pour tout $x \notin A$ il existe $r \in \mathbb{R}$ tel que $A \cap B(x, r) = \emptyset$.
- c. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans A et convergente vers $x \in \mathbb{R}$. Montrer qu'on a nécessairement $x \in A$.
- d. En déduire que A est fermé.

Exercice 9. On dit que deux réels x, y sont de même signe si on a ($x > 0$ et $y > 0$) ou ($x < 0$ et $y < 0$). On s'intéresse aux deux sous-ensembles suivants de \mathbb{R} :

$$\begin{aligned} A &= \{x \in \mathbb{R} \mid \cos(x) \text{ et } \sin(x) \text{ sont de même signe}\}, \\ B &= \{x \in \mathbb{R} \mid \cos(x) \text{ et } \sin(x\sqrt{2}) \text{ sont de même signe}\}. \end{aligned}$$

- a. Tracer sommairement les graphes des fonctions sinus et cosinus sur $[0, 2\pi]$.
- b. Représenter A sur la droite réelle, entre -3π et 3π .
- c. Montrer que x appartient à A si et seulement si il existe un entier relatif $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x \in]k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2}[$.
- d. Écrire A comme réunion d'un nombre infini d'intervalles. Montrer que A est ouvert.
- e. Montrer que les fonctions suivantes sont continues :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \cos(x) \sin(x) \quad \text{et} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \cos(x) \sin(x\sqrt{2}).$$

- f. Exprimer A et B comme des images réciproques. Montrer que B est ouvert.
- g. Peut exprimer B comme réunion d'intervalles ? (*Question subsidiaire*)

Exercice 10. On se propose de montrer à l'aide de la définition que les parties de \mathbb{R} suivantes sont ouvertes :

$$A = \mathbb{R} \setminus [-1, 1], \quad B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}.$$

- a. Soit $x \in A$ et $r = |x| - 1$.
Montrer que la boule ouverte de centre x et rayon r est incluse dans A .
- b. Soit $x \in B$ et $r = |x - E(x + \frac{1}{2})|$.
Montrer que la boule ouverte de centre x et rayon r est incluse dans B .
- c. En déduire que A et B sont ouverts.
On n'oubliera pas de vérifier que les réels r ci-dessus ne sont pas nuls.